

| <u>NOMBRE POPULAR</u> AGUARIBAY FALSO PIMENTERO | | <u>NOMBRE CIENTIFICO</u> SCHINUS MOLLE | <u>FAMILIA</u> ANACARDIÁCEAS - DICOTILEDÓNEAS | <u>USOS</u> SOMBRA - AISLADO-HILERA - EN AGRUPAMIENTO | | <u>OBSERVACIONES</u> |
|--|---------------------------|---|--|---|--|---|
| <u>ESPECIE</u> <u>FORMA</u> Semiesférica Bóveda de medio punto. | | <u>TIPO DE SOMBRA</u>  | | <u>COLOR</u> | <u>FORMA</u> | <u>TEXTURA</u> |
|  | | | <u>HOJA</u>  | Verde claro | Alternas de 25 a 30 cm de largo. Compuestas de folíolos lanceolados de 3 a 6 cm. | Resinosas de aroma pregnante. |
| | | | <u>FLORES</u>  | Blanco amarillentas | Pequeñas. En racimos terminales. Unisexuales. Pendular de 10 a 20 cm de largo. | Rugosa con nervaduras muy decorativas. |
| | | | <u>FRUTOS</u>  | Rojo intenso. Amarronado en su proceso de secado. | Drupas esféricas de 5 a 8 mm de diámetro. Permanecen todo el invierno | Pulimentada. Picantes, lisos, similar a la pimienta. Se emplea para condimentar embutidos. |
| | | | <u>EPOCA DE BROTES</u> | Mediados de primavera a mediados de otoño. | <u>AMBIENTE</u> | Soleado y media sombra |
| | | | <u>EPOCA DE FLORACION</u> | Primavera y verano | <u>SUELO</u> | Todos. Resiste las sequías. |
| <u>ALTURA</u> 10 a 20 m | <u>COPA</u> Diám. 5 a 10m | <u>TRONCO</u> Hasta 1m de diámetro | | | | <u>ORIGEN</u> SUDAMÉRICA: CHILE - PERU - PARAGUAY - BOLIVIA - ARGENTINA |
| | | <u>TEXTURA</u> Rústica  | | | | En medicina popular la decocción de la corteza es empleada para cicatrizar úlceras y heridas. |
| <u>CRECIMIENTO</u> Rápido En suelos adecuados. | | <u>TIPO DE HOJAS</u> Perennes | <u>EPOCA DE FRUCTIFICACIÓN</u> Otoño | | <u>RESISTE VIENTOS</u> SI | Madera semi-dura y pesada. Tiene usos locales en carpintería. |
| | | | | | <u>RESISTE HELADAS</u> 1/2 | |