

<u>NOMBRE POPULAR</u> CEIBO O SEIBO		<u>NOMBRE CIENTIFICO</u> ERYTHRINA CRISTA- GALLI		<u>FAMILIA</u> LEGUMINOSAS DICOTILEDÓNEAS		<u>USOS</u> PUNTUAL O BOSQUECILLO EN GALERÍA		<u>OBSERVACIONES</u>	
								<u>SIEMBRA/PLANTADO</u>	
<u>ESPECIE FORMA</u>	Extendida (Irregular)	<u>TIPO DE SOMBRA</u>			<u>COLOR</u>	<u>FORMA</u>	<u>TEXTURA</u>	En climas de predominio cálido.	
 <p style="text-align: center;">"FLOR NACIONAL ARGENTINA" Decreto Poder Ejecutivo 138974/22/11/42</p>				<u>HOJA</u>	 Verde claro amarillento en la cara superior. Pálida en el envés.	Compuestas con espinas en el pedúnculo o en cara superior. Medidas 1,2 cm a 2,5 cm.	Folíolos ovales y elípticos. Presenta aguijones curvos. Lisa arriba, rústica abajo	Se reproduce por semillas y esquejes basales.	
				<u>FLORES</u>	 Rojo medio, rojo carmín, Rojo carmesí y blancas	En grupos. Amariposadas de 3 a 5 cm, con pétalos carnosos con estandarte	Aterciopeladas, invertidas y compuestas	Sinónimos vulgares: CHOPO- SUIÑANDI - CORTICEIRA.	
				<u>FRUTOS</u>	 Color castaño negruzco. 2 a 8 semillas, color pardo oscuras	Legumbre arqueada comprimida entre las semillas, de 10 a 30 cm de largo	Rústicos. Porosos.	Corteza gruesa y rugosa. Pardo -grisácea	
				<u>EPOCA DE BROTES</u>	Primavera - Otoño	<u>AMBIENTE</u>	Cálido	<u>AREA DE DISPERSIÓN:</u> URUGUAY -PARAGUAY- ARGENTINA -BRASIL- BOLIVIA	
				<u>EPOCA DE FLORACION</u>	2 floraciones al año Primavera - Otoño	<u>SUELO</u>	Todos.Preferent. los húmedos	<u>PODA:</u> Admite poda correctiva	
<u>ALTURA COPA</u>	5 a 10 m Diám.: 8 a 12 m	<u>TRONCO</u> Diam.hasta 0,80 m		<u>EPOCA DE FRUCTIFICACIÓN</u>	Otoño	<u>RESISTE SI VIENTOS</u>	Madera blanda mediocre. Utilizada en trabajos menores.		
<u>CRECIMIENTO</u>	Rápido	<u>TIPO DE HOJAS</u>	Caducas			<u>RESISTE NO HELADAS</u>	Árbol ornamental. En E.E.U.U. es planta de interior, llamado "Coral Tree". Pertenece a los árboles llorones.		