









<u>NOMBRE POPULAR</u> PALO BORRACHO		<u>NOMBRE CIENTIFICO</u> CHORISIA INSIGNIS (blanca)		<u>FAMILIA</u> BOMBACÁCEAS - NOMBRE BOTÁNICO: SAMOHU -YUCHAN		<u>USOS</u> AGRUPADO -HILERAS - PUNTUAL - COMBINADAS		<u>OBSERVACIONES</u>					
<u>ESPECIE FORMA</u> EXTENDIDA		<u>TIPO DE SOMBRA</u>						SIEMBRA/PLANTADO Por semillas. Por esquejes.					
   				<u>HOJA</u>				Verde claro o verde medio de acuerdo a su edad y especie.		<u>Sinónimos vulgares:</u> PALO BORRACHO - ALGODÓN - ALGODONERO - MANDIYU - RA - SAMUHU -PAINEIRA			
				<u>FLORES</u>				Blancas, amarillentas o rosadas con interior pigmentado.		Morfología en similitud con la orquídea. Flores grandes hermafroditas. Corola de 5 pétalos.		Corteza verde relativamente lisa. En la adultez su corteza es grisácea.	
				<u>FRUTOS</u>				Verde -parduzco con su interior blanco. Contiene semillas.		Aovada. Semeja a una pequeña pelota de rugby. Cápsula oblonga de 15 a 20 cm por 5 a 7 cm de diámetro.		Visitada por insectos y picaflores para la polinización.	
				<u>EPOCA DE BROTES</u>		Primavera tardía Sus hojas cubren la copa totalmente		<u>AMBIENTE</u>		Cálido y soleado		<u>AREA DE DISPERSION</u> PARAGUAY- BRASIL- ARGENTINA- URUGUAY (en nuestro país hasta el de Bs. Aires)	
				<u>EPOCA DE FLORACION</u>		Estivo- otoñal (enero a junio)		<u>SUELO</u>		Casi todos. Ricos y húmedos.		<u>PODA</u> Formativa únicamente.	
<u>ALTURA COPA</u>		10 a 20 m 8 a 12 m		<u>TRONCO</u>		Diám.de 0,80 a 1,20m		<u>AREA DE DISPERSION</u> árbol semejan algodón finísimo.					
<u>CRECIMIENTO</u>		Medio		<u>TIPO DE HOJAS</u>		Caducas tardías		Con el nombre Samohu fue denominada una población del Chaco.					
				<u>EPOCA DE FRUCTIFICACIÓN</u>		1 1º semana de setiembre Principios de primavera		<u>RESISTE VIENTOS</u> SI <u>RESISTE HELADAS</u> NO					